

## Tuoteseloste

**Valmistaja** Gasum Oy **Valmistuspaikka** Gasum Oy, Kouvolan biokaasulaitos  
**Tyyppinimi** Mädätysjäännös **Kauppanimi** Gasum Perus, Kouvola

**Laitoshyväksyntäno.** FIB239-07552/2010

**Raaka-aineet** Teollisuuden biohajoavat 3 lk:n sivutuotteet, puhdistamoliete, erilliskerätty ja kaupan biojäte

**Pakkauskoko** Tuote toimitetaan irtotavarana

**Tilavuuspaino** 999 kg/m<sup>3</sup> **Johtokyky** 300 mS/m  
**Kosteus** 98,5 % **Orgaaninen aines** 60 % kuiva-aineesta  
**pH** 8,6 **Karkeusaste** < 12 mm  
**E.coli** <10 pmy/g **Salmonella** ei todettu/25 g **Tuote on hygienisoitu**

**Tuoteseloste on voimassa lannoitetoimituksille 01.10.2021- 31.12.2021**

**Tuote-erän tunnus 2021 004**

<b>Pääravinteet</b>	Kokonaistyyppi, N <sub>tot</sub>	157,8	g/kg kuiva-ainetta	2,4	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Vesiliukoinen typpi, N <sub>liuk</sub>	130	g/kg kuiva-ainetta	1,95	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	<i>Laskennassa huomioitava typpipitoisuus</i>			<i>1,95</i>	<i>kg/m<sup>3</sup></i>
	Kokonaisfosfori, P <sub>tot</sub>	20	g/kg kuiva-ainetta	0,3	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	<i>Laskennassa huomioitava fosforipitoisuus ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuneilla tiloilla</i>			<i>0,18</i>	<i>kg/m<sup>3</sup></i>
	Vesiliukoinen fosfori, P <sub>liuk</sub>	5,6	g/kg kuiva-ainetta	0,08	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Kokonaiskalium, K <sub>tot</sub>	45	g/kg kuiva-ainetta	0,67	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa

<b>Hivenravinteet</b>	Rikki, S	7,5	g/kg kuiva-ainetta	0,11	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Magnesium, Mg	4,4	g/kg kuiva-ainetta	0,066	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Mangaani, Mn	0,23	g/kg kuiva-ainetta	0,003	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Boori, B	<0,0 05	g/kg kuiva-ainetta	<0,000 07	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Rauta, Fe	80	g/kg kuiva-ainetta	1,2	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Kupari, Cu	0,02 9	g/kg kuiva-ainetta	0,0004	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Sinkki, Zn	0,21	g/kg kuiva-ainetta	0,003	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa
	Natrium, Na	45	g/kg kuiva-ainetta	0,67	kg/m <sup>3</sup> tuorepainossa

Haitalliset metallit	Mitattu pitoisuus tuotteessa	Sallittu pitoisuus (MMMä 24/11)	
Arseeni, As	1	25	mg/kg kuiva-ainetta
Elohopea, Hg	0,11	1,0	mg/kg kuiva-ainetta
Kadmium, Cd	0,18	1,5	mg/kg kuiva-ainetta
Kromi, Cr	<2	300	mg/kg kuiva-ainetta
Kupari, Cu	29	600*	mg/kg kuiva-ainetta
Lyijy, Pb	4	100	mg/kg kuiva-ainetta
Nikkeli, Ni	<4	100	mg/kg kuiva-ainetta
Sinkki, Zn	210	1500*	mg/kg kuiva-ainetta

\*Ylitys voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu puutetta kuparista tai sinkistä

**Käyttötarkoitus** Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannusaineena ja ravinnelisänä peltokäyttöön mm. kasvatettaessa viljaa, sokerijuurikasta, tärkkelysperunaa tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Tuote ei sovellu käytettäväksi perunalle, juureksille, tuoreille vihanneksille, yrtti- ja juurimausteille, kotipuutarhoihin eikä taimituotantoon, varoaika 5 vuotta. Nurmelle tuotetta saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla se huolellisesti. Tuotetta ei saa luovuttaa jatkojalostukseen tai edelleen luovutettavaksi.

**Käyttöohje** Huomioi nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rajoitukset levitykseen. Valmisteen käyttö on sallittua vain sellaisella viljelymaalla, jonka raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä taulukossa 1 esitettyjä enimmäispitoisuuksia. Ennen tuotteen käyttöä tulee viljelijän tarvittaessa määrittää viljelymaan raskasmetallipitoisuudet sellaisilta lohkoilta, jolle käsiteltyä puhdistamolietettä levitetään, jos on aihetta epäillä, että suurimmat raskasmetallipitoisuudet voivat ylittyä.\*) Ohje raskasmetallipitoisuuden määrittämisestä on tämän tuoteselosteen lopussa. Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteeseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Valmistetta ei saa levittää 30.10.–1.4. välisenä aikana. Lannoitevalmiste on pyrittävä multaamaan tai kyntämään välittömästi levityksen jälkeen, jotta ravinteiden haihtuminen saadaan estettyä. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnnettävä. Ravinlaskentaa tehtäessä huomioidaan kokonaisfosforista 60 %, näin ollen myös fosforintasausmahdollisuus ja sen hyödyntäminen on käytettävissä ympäristökäyttöehtojen mukaisesti.

**OHJE: Raskasmetallipitoisuuden määrittäminen viljelysmaasta**

Viljelymaan analysoinnissa on kultakin peltolohkolta viljelymaan muokkauskerroksesta (0-25 cm) otettava yksi kokoomanäyte, kuten yleensä viljavuustutkimusta varten. Lohkon kultakin hehtaarilta otetaan lohkon kokoomanäytteeseen vähintään viisi näytettä. Maanäytteistä analysoidaan luotettavassa laboratorioissa ainakin pH, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, sinkki ja elohopea. Päätöksessä on mainittu suositeltavat määritysmenetelmät. Käytetty menetelmä on aina mainittava.

**Taulukko 1. Viljelysmaan raskasmetallien enimmäispitoisuudet mg / kg kuiva-ainetta**

<b>Kadmium (Cd)</b>	<b>0,5</b>	<b>Kromi (Cr)</b>	<b>200</b>
<b>Kupari (Cu)</b>	<b>100</b>	<b>Elohopea (Hg)</b>	<b>0,2</b>
<b>Nikkeli (Ni)</b>	<b>60</b>	<b>Lyijy (Pb)</b>	<b>60</b>
<b>Sinkki (Zn)</b>	<b>150</b>		

\*) Raskasmetallipitoisuus on syytä määrittää ainakin, mikäli peltolohkot sijaitsevat raskasmetallilaskeumaa mahdollisesti aiheuttavan teollisuuslaitoksen tai vilkkaasti liikennöidyn valtatie varrella tai pellolla on lannoituksessa aiemmin käytetty sellaisia lannoitevalmisteita, joiden käyttöön voi liittyä riski raskasmetalleista (esim. kuonat, tuhkat, puhdistamoliete erityisesti ennen vuotta 1994).