

Tuoteseloste

Valmistaja Gasum Oy **Valmistuspaikka** Gasum Oy, Kuopion biokaasulaitos
Tyyppinimi Mädätysjäännös **Kauppanimi** Gasum Perus, Kuopio

Laitoshyväksyntäno. FIB239-09528/2013

Raaka-aineet Teollisuuden biohajoavat 3 lk:n sivutuotteet, puhdistamoliete, erilliskerätty ja kaupan biojäte

Pakkauskoko Tuote toimitetaan irtotavarana

Tilavuuspaino 986 kg/m³ **Johtokyky** 460 mS/m

Kosteus 94,0 % **Orgaaninen aines** 63,7 % kuiva-aineesta

pH 8,1 **Karkeusaste** < 12 mm

E.coli <10 pmy/g **Salmonella** ei todettu/25 g **Tuote on hygienisoitu**

Tuoteseloste on voimassa lannoitetoimituksille 1.7.2022 - 30.9.2022.

Tuote-erän tunnus 2022 003

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--------------------|------|---------------------------------|
| Pääravinteet | Kokonaistyyppi, N _{tot} | 96,3 | g/kg kuiva-ainetta | 5,7 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Vesiliukoinen tyyppi, N _{liuk} | 54 | g/kg kuiva-ainetta | 3,2 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | <i>Laskennassa huomioitava typpipitoisuus</i> | | | 3,2 | kg/m ³ |
| | Kokonaisfosfori, P _{tot} | 35 | g/kg kuiva-ainetta | 2,1 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | <i>Laskennassa huomioitava fosforipitoisuus ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuneilla tiloilla</i> | | | 1,26 | kg/m ³ |
| | Vesiliukoinen fosfori, P _{liuk} | 0,61 | g/kg kuiva-ainetta | 0,04 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Kokonaiskalium, K _{tot} | 17 | g/kg kuiva-ainetta | 1,0 | kg/m ³ tuorepainossa |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|--------------------|-------|---------------------------------|
| Hivenravinteet | Rikki, S | 8,2 | g/kg kuiva-ainetta | 0,49 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Magnesium, Mg | 5,2 | g/kg kuiva-ainetta | 0,3 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Mangaani, Mn | 0,33 | g/kg kuiva-ainetta | 0,02 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Boori, B | 0,01 | g/kg kuiva-ainetta | 0,001 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Rauta, Fe | 81 | g/kg kuiva-ainetta | 4,8 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Kupari, Cu | 0,12 | g/kg kuiva-ainetta | 0,007 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Sinkki, Zn | 0,33 | g/kg kuiva-ainetta | 0,02 | kg/m ³ tuorepainossa |
| | Natrium, Na | 18 | g/kg kuiva-ainetta | 1,1 | kg/m ³ tuorepainossa |

| Haitalliset metallit | Mitattu pitoisuus tuotteessa | Sallittu pitoisuus (MMM 24/11) | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Arseeni, As | 2 | 25 | mg/kg kuiva-ainetta |
| Elohopea, Hg | 0,2 | 1,0 | mg/kg kuiva-ainetta |
| Kadmium, Cd | 0,24 | 1,5 | mg/kg kuiva-ainetta |
| Kromi, Cr | 25 | 300 | mg/kg kuiva-ainetta |
| Kupari, Cu | 120 | 600* | mg/kg kuiva-ainetta |
| Lyijy, Pb | 4 | 100 | mg/kg kuiva-ainetta |
| Nikkeli, Ni | 19 | 100 | mg/kg kuiva-ainetta |
| Sinkki, Zn | 330 | 1500* | mg/kg kuiva-ainetta |

*Ylitys voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu puutetta kuparista tai sinkistä

Käyttötarkoitus Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannusaineena ja ravinnelisinä peltokäyttöön mm. kasvatettaessa viljaa, sokerijuurikasta, tärkkelysperunaa tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Tuote ei sovellu käytettäväksi perunalle, juureksille, tuoreille vihanneksille, yrtti- ja juurimausteille, kotipuutarhoihin eikä taimituotantoon, varoaika 5 vuotta. Nurmelle tuotetta saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla se huolellisesti. Tuotetta ei saa luovuttaa jatkojalostukseen tai edelleen luovutettavaksi.

Käyttöohje Huomioi nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rajoitukset levitykseen. Valmisteen käyttö on sallittua vain sellaisella viljelymaalla, jonka raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä taulukossa 1 esitettyjä enimmäispitoisuuksia. Ennen tuotteen käyttöä tulee viljelijän tarvittaessa määrittää viljelymaan raskasmetallipitoisuudet sellaisilta lohkoilta, jolle käsiteltyä puhdistamolietettä levitetään, jos on aihetta epäillä, että suurimmat raskasmetallipitoisuudet voivat ylittyä.*) Ohje raskasmetallipitoisuuden määrittämisestä on tämän tuoteselosteen lopussa. Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteeseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Valmistetta ei saa levittää 30.10.–1.4. välisenä aikana. Lannoitevalmiste on pyrittävä multaamaan tai kyntämään välittömästi levityksen jälkeen, jotta ravinteiden haihtuminen saadaan estettyä. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnnettävä. Ravinlaskentaa tehtäessä huomioidaan kokonaisfosforista 60 %. Fosforintausmahdollisuus ja sen hyödyntäminen on käytävissä ympäristötukiehtojen mukaisesti.

OHJE: Raskasmetallipitoisuuden määrittäminen viljelysmaasta

Viljelymaan analysoinnissa on kultakin peltolohkolta viljelymaan muokkauskerroksesta (0-25 cm) otettava yksi kokoomanäyte, kuten yleensä viljavuustutkimusta varten. Lohkon kultakin hehtaarilta otetaan lohkon kokoomanäytteeseen vähintään viisi näytettä. Maanäytteistä analysoidaan luotettavassa laboratorioissa ainakin pH, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, sinkki ja elohopea. Päätöksessä on mainittu suositeltavat määrittämenetelmät. Käytetty menetelmä on aina mainittava.

Taulukko 1. Viljelymaan raskasmetallien enimmäispitoisuudet mg / kg kuiva-ainetta

| | | | |
|--------------|-----|---------------|-----|
| Kadmium (Cd) | 0,5 | Kromi (Cr) | 200 |
| Kupari (Cu) | 100 | Elohopea (Hg) | 0,2 |
| Nikkeli (Ni) | 60 | Lyijy (Pb) | 60 |
| Sinkki (Zn) | 150 | | |

*) Raskasmetallipitoisuus on syytä määrittää ainakin, mikäli peltolohkot sijaitsevat raskasmetallilaskeumaa mahdollisesti aiheuttavan teollisuuslaitoksen tai vilkkaasti liikennöidyn valtatievarrella tai pellolla on lannoituksessa aiemmin käytetty sellaisia lannoitevalmisteita, joiden käyttöön voi liittyä riski raskasmetalleista (esim. kuonat, tuhkat, puhdistamoliete erityisesti ennen vuotta 1994).